

31. $10^{\log 10^{35}} =$ কত ?
 a) 35 b) 0 c) 1 d) 10
32. 4টি দ্রব্যের ক্রয়মূল্য ঐরূপ 3টি দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য হলে লাভ হয় -
 a) 25 % b) 33 % c) 37 % d) 40 %
33. কোনো পরিসংখ্য বিভাজন তালিকার কোনো শ্রেণির শ্রেণি-মধ্যমান 15 এবং প্রতিটি শ্রেণির শ্রেণি দৈর্ঘ্য 5 হলে, সেই শ্রেণির নিম্নসীমা -
 a) 10 b) 10.5 c) 15 d) 12.5
34. কোনো ত্রিভুজের বাহুগুলির দৈর্ঘ্য 3 সেমি, 34 সেমি ও 5 সেমি হলে, তার পরিব্যাসার্ধ হয় -
 a) 3 সেমি b) 2.5 সেমি c) 34 সেমি d) 4 সেমি
35. একটি ঘড়ির ঘন্টার কাঁটার দৈর্ঘ্য 14 সেমি, পঁয়তাল্লিশ মিনিটে কাঁটাটির অগ্রভাগের বিন্দুটি কত দূরত্ব ঘরবে ?
 a) 55 সেমি b) 66 সেমি c) 44 সেমি d) কোনোটিই নয়।
36. দুটি মৌলিক সংখ্যার সমষ্টি 20 এবং তাদের ল. সা. গু. 99। সংখ্যাদুটিই হল -
 a) 8, 12 b) 13, 7 c) 17, 3 d) 9, 11
37. $x = -2$ এবং $y = 2$ সমীকরণদ্বারা গঠিত সরলরেখাদ্বয় -
 a) পরস্পর সমান্তরাল b) পরস্পরছেদী
 c) পরস্পরছেদী ও সমান্তরাল ঐরূপ সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। d) একই সরলরেখা।
38. $f(x + 2) = x^2 + 2x + 3$ হলে $f(x) =$ কত ?
 a) $x^2 + 2x + 3$ b) $x^2 - 2x + 3$ c) $x^2 - 2x - 3$ d) $x^2 + 3x - 2$
39. $x = 3 + \frac{1}{x}$ হলে, $\frac{4x}{x^2 + x - 1}$ -এর মান কত ?
 a) 0 b) -1 c) 1 d) 2
40. $4x + 4y = 20$ এবং $5x + 5y = 30$ সমীকরণদ্বয়ের -
 a) একটি নির্দিষ্ট সমাধান আছে। b) অসংখ্য সমাধান আছে।
 c) কোনো সমাধান নেই। d) কোনটিই নয়।
41. ABCD একটি চতুর্ভুজ যার $\angle A : \angle B : \angle C : \angle D = 3 : 2 : 1 : 4$, তাহলে ABCD একটি -
 a) সামান্তরিক b) রম্বস c) ট্র্যাপিজিয়াম d) বর্গক্ষেত্র।
42. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলির মধ্যবিন্দুগুলি ক্রমান্বয়ে যুক্ত করলে যতগুলি সামান্তরিক উৎপন্ন হয়, তার সংখ্যা -
 a) 2 b) 3 c) 4 d) 6
43. $(-1, 2)$ ও $(3, 4)$ বিন্দুদ্বয় থেকে সমদূরবর্তী y-অক্ষের উপর বিন্দুর স্থানাঙ্ক হল -
 a) $(5, 0)$ b) $(0, 4)$ c) $(0, 5)$ d) কোনোটিই নয়।
44. $(h, \frac{1}{h})$, $(k, \frac{1}{k})$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখাংশ মূলবিন্দুগামী হলে, h ও k -এর মধ্যে সম্পর্কযুক্ত সমীকরণটি হল -
 a) $h^2 + k^2 = 0$ b) $h^2 = k^2$ c) $h = k^2$ d) $h = -k$
45. একটি বর্গাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 8 হেক্টর। এক ব্যক্তি ঘন্টায় 4 কিমি বেগে হাঁটলে ওই ক্ষেত্রের একটি কর্ণের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে সময় লাগবে -
 a) 5 মিনিট b) 6 মিনিট c) 8 মিনিট d) কোনোটিই নয়।
46. একটি রম্বসের দুটি কর্ণ যথাক্রমে 12 সেমি ও 16 সেমি, রম্বসটির একটি বাহুর দৈর্ঘ্য -
 a) 20 সেমি b) 10 সেমি c) 5 সেমি d) 100 সেমি
47. $5\sqrt{5} \times 5^3 \div 5^{-\frac{3}{2}} = 5^{a+2}$ হলে a-এর মান হবে -
 a) 4 b) 5 c) 6 d) 8
48. যদি $f(x) = 2x + \frac{1}{2x}$ হয় তবে $f(\frac{1}{p}) =$?
 a) $\frac{p}{2} + \frac{2}{p}$ b) $\frac{p}{2} - \frac{2}{p}$ c) $\frac{2}{p} - \frac{p}{2}$ d) $2p + \frac{1}{2p}$
49. ABC ত্রিভুজের AD, BE ও CF হল তিনটি মধ্যমা। নীচের কোনটি $\frac{AB + BC + CA}{AD + BE + CF}$ এর মান হতে পারে না ?
 a) $\frac{7}{12}$ সেমি b) $\frac{17}{24}$ সেমি c) $\frac{35}{48}$ সেমি d) কোনোটিই নয়।
50. ABCD সামান্তরিকের BC বাহুর মধ্যবিন্দু E, DE এবং বর্ধিত AB পরস্পর F বিন্দুতে মিলিত হয়। AF-এর দৈর্ঘ্য সমান -
 a) $\frac{3}{2} AB$ b) $3AB$ c) $2AB$ d) $\frac{5}{4} AB$

11. $x = k$ (ধ্রুবক) এবং $y = c$ (ধ্রুবক) দ্বারা উৎপন্ন সরলরেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের মান -
a) 30° b) 60° c) 45° d) 90°
12. $x = 3$ এবং $y + 2 = 0$ সরলরেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ -
a) $3x + 2y = 13$ b) $3x - 2y = 13$
c) $2x - 3y = 13$ d) $2x + 3y = 13$
13. $\frac{x}{p} = \frac{1}{p} - \frac{1}{x}$ হলে, $x - x^2$ -এর মান হবে -
a) p^2 b) p c) $-p^2$ d) $-p$
14. $x^{(\log x^a \times \log a^y \times \log y^x)}$ -এর মান
a) a b) x c) y d) কোনটিই নয়।
15. XYZ সমবাহু ত্রিভুজের XY ও XZ-র মধ্যবিন্দু যথাক্রমে P ও Q যদি $PQ + XY = 24$ সেমি হয়, তবে
a) 12 সেমি b) 8 সেমি c) 6 সেমি d) 4 সেমি
16. $\triangle ABC$ -এর অন্তবর্তী কোনো একটি বিন্দু থেকে ত্রিভুজের বাহুগুলির লম্ব দূরত্ব যথাক্রমে h_1, h_2 ও h_3 এবং ত্রিভুজটির উচ্চতা H। যদি $H = h_1 + h_2 + h_3$ হয়, তবে ত্রিভুজটি -
a) সমবাহু b) সমদ্বিবাহু c) বিষমবাহু d) সমকোণী
17. ABCD বর্গাকার চিত্রের AD বাহুর উপর M একটি বিন্দু যাতে $\angle CMD = 30^\circ$ হয়। কর্ণ BD, CM-কে P বিন্দুতে ছেদ করলে $\angle DPC$ -এর পরিমাপ -
a) 45° b) 75° c) 25° d) 30°
18. $x = y = 2$ সমীকরণটির লেখচিত্র কোন্ পাদে কোনো অবস্থাতেই থাকবে না?
a) প্রথম b) দ্বিতীয় c) তৃতীয় d) চতুর্থ
19. একটি দ্রব্য পরপর 20% ও 10% ছাড়ে বিক্রয় করা হলে সমতুল্য ছাড় কত?
a) 28% b) 25% c) 20% d) 29%
20. $25^3 - 75^3 + 50^3 + 3 \times 25 \times 75 \times 50$ -এর মান
a) 150 b) 0 c) 25 d) 50
21. $(2a, 2b)$, $(2c, 2d)$ ও $(2m, 2n)$ শীর্ষবিন্দু বিশিষ্ট ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের (h, k) হলে h ও k -এর মান -
a) $h = a + b + m$ b) $h = a + c + m$ c) $h = b + d + m$ d) $h = b + m$
 $k = b + d + n$ $k = b + d + n$ $k = a + c + n$ $k = a + n$
22. $x^4 + x^3 - 10x^2 + 7x + 2$ -এর একটি উৎপাদক হবে -
a) $x + 2$ b) $x + 1$ c) $x - 1$ d) $x - 2$
23. যদি স্বাভাবিক সংখ্যাগুলি N, পূর্ণসংখ্যাগুলি Z, মূলদ সংখ্যা গুলি Q এবং বাস্তব সংখ্যাগুলি R দ্বারা সূচিৎ হয়, তবে -
a) $N > Z > Q > R$ b) $N < Z < Q < R$ c) $N < Z > Q < R$ d) $N < Z > Q > R$
24. $4 \times 2 = 64$ হলে x কত?
a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{256}$ c) $\sqrt{2}$ d) কোনটিই নয়।
25. $3x - 4y = 12$ সমীকরণ দ্বারা উৎপন্ন লেখচিত্রের অক্ষদ্বয় দ্বারা ছেদিতাংশের দৈর্ঘ্য -
a) 3 একক b) 4 একক c) 7 একক d) 5 একক
26. PQRS সামান্তরিকের $\angle P = 3x + 4y$ এবং $\angle R = 5x + 3y$ হলে x ও y -র মধ্যে সম্পর্কটি হল -
a) $x + y = 0$ b) $x = y$ c) $x = \frac{1}{2}y$ d) $y = \frac{1}{2}x$
27. $2 \log_{10} x = 1 + \log_{10} \sqrt{y}$ এবং $x = 2$ হলে y -এর মান -
a) $\frac{25}{4}$ b) $\frac{4}{25}$ c) 25 d) 4
28. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল π^2 হলে, ওর পরিসীমা
a) $\pi\sqrt{\pi}$ b) $2\pi\sqrt{\pi}$ c) π^3 d) $\sqrt{\pi}$
29. যদি $f(x) = 3x - 5$ এবং $g(x) = 2x - 3$ হয়, তবে $[f(x - 1) - g(x + 1)]$ -এর মান হবে -
a) $x - 7$ b) $7 - x$ c) 7 d) x
- (4) 30. $(a + b)(p + cq) - (b + c)(p + aq)$ -এর উৎপাদকগুলি কী কী?
a) $(c - a)(bq - p)$ b) $(a - c)(pq - b)$
c) $(b - c)(aq - p)$ d) $(p - q)(aq - c)$

প্রশ্নপত্র শ্রেণি - নবম (Class - IX) সময় : ২ ঘন্টা	গণিত মেধা অন্বেষণ ২০২২ আয়োজক : দ্য পাই গ্রুপ অফ ম্যাথামেটিকস Organised by : The Pi Group of Mathematics (TPGM)	পূর্ণমান : ১০০ তারিখ - 13/11/2022 রবিবার
--	--	---

* উত্তর লেখার আগে ভালো করে “পরীক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশ”-গুলো পড়ে নিতে হবে *

**** পরীক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশ ****

- উত্তরপত্রের নির্দিষ্ট জায়গায় পরীক্ষার্থীর নাম, পরীক্ষার রোল নম্বর, শ্রেণী এবং বিদ্যালয়ের নাম ঠিকমত লিখতে হবে।
- প্রতিটি প্রশ্নের মান ২ করে মোট ৫০টি প্রশ্ন আছে।
- প্রশ্নপত্রেই প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ৪টি করে “সম্ভাব্য উত্তর” (Option) প্রশ্নের পাশেই দেওয়া আছে।
- উত্তরপত্রে প্রত্যেক প্রশ্নের নম্বরের পাশে ঐ “সম্ভাব্য উত্তর” (Option)-গুলির শুধু নাম্বার, যথাক্রমে (a), (b), (c) এবং (d) দেওয়া আছে।
- কোনো প্রশ্নের যে উত্তরটি সঠিক উত্তর পত্রের ঐ প্রশ্নের নম্বরের পাশে শুধু সেই সম্ভাব্য উত্তর (Option)-এর নম্বরটির ওপর “টিক চিহ্ন” () দিতে হবে। যেমন ধরা যাক 10. নম্বর প্রশ্নের চতুর্থ অথবা (d) Option টি সঠিক। তাহলে উত্তর পত্রের 10. নম্বরের পাশে (d)এর ওপর “টিক চিহ্ন” (✓) দিতে হবে।
- কোন ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না।

- একটি ত্রিভুজ P ও Q দুটি অংশে বিভক্ত। P অংশের ক্ষেত্রফল 5 বর্গসেমি, Q অংশের ক্ষেত্রফল 7 বর্গসেমি। ত্রিভুজের ভূমি 4 সেমি হলে, উচ্চতা কত?

a) 6 সেমি b) 3 সেমি c) 4 সেমি d) কোনোটিই নয়।

- মান নির্ণয় কর :

a) $\frac{7}{10}$ b) $\frac{3}{16}$ c) $\frac{9}{10}$ d) $\frac{7}{9}$

- একটি পরিসংখ্য বিভাজন তালিকার শ্রেণির মধ্যবিন্দু যথাক্রমে 15, 20, 25, 30। যে শ্রেণির মধ্যবিন্দু 20 সেটি হল -

a) 12.5 - 17.5 b) 17.5 - 22.5 c) 18.5 - 21.5 d) 19.5 - 20.5

- a ও b কোন্ মানের জন্য $5x+8y=7$ এবং $(a+b)x + (a-b)y = (2a+b+1)$ সমীকরণদ্বয়ের অসংখ্য সমাধান থাকবে?

a) $a = -\frac{13}{9}$ b) $a = -\frac{13}{6}$ c) $a = -\frac{12}{5}$ d) $a = -\frac{1}{2}$
b) $b = \frac{1}{3}$ b) $b = \frac{1}{6}$ b) $b = -\frac{10}{3}$ b) $b = -\frac{5}{2}$

- $an^4 + bn^3 + cn^2 + dn + e$ বহুপদী সংখ্যামালার $(n^2 - 1)$ উৎপাদক হলে -

a) $a + c + e = b + d$ b) $a + b + e = c + d$
c) $a + b + c = d + e$ d) $b + c + d = a + e$

- 0.04-এর লগারিদম -2 হলে, নিধান হিসেব কর -

a) 5 b) 3 c) 4 d) 1

- একটি রম্বসের দুটি সন্নিহিত কোণের মান $2x - 35^\circ$ এবং $x + 5^\circ$ হলে, x-এর মান নির্ণয় কর -

a) 70° b) 40° c) 35° d) 45°

- $P(0, m^2)$ এবং $Q(n^2, 0)$ বিন্দুর সংযোজক রেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(\frac{9}{2}, 2)$ হলে, m ও n-র মান -

a) $m = 3, n = 2$ b) $m = -3, n = -2$ c) $m = \pm 3, n = \pm 2$ d) $m = \pm 2, n = \pm 3$

- একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ও তার পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফলের অনুপাত -

a) $3\sqrt{3} : 8\pi$ b) $3\sqrt{3} : 2\pi$ c) $2\sqrt{3} : 4\pi$ d) $2\sqrt{3} : 3\pi$

- নীচের কোনটি সত্য?

a) $5^{3^2} = (5^3)^2$ b) $5^{3^2} < (5^3)^2$ c) $5^{3^2} > (5^3)^2$ d) $5^{3^2} - (5^3)^2 = 5^2$